

	<b>Prealítica</b>	Código	INS-03-32
		Edición	02
		Página 1 de 1	
		Inicio Vigencia	Mayo 2025
		Término Vigencia	Mayo 2028
<b>Obtención de muestra para Chlamydia, Neisseria, Ureaplasma, Mycoplasma, Trichomonas</b>			

## Obtención de muestra para Chlamydia, Neisseria, Ureaplasma, Mycoplasma, Trichomonas, Herpes Simple, Candida, Panel ETS, Treponema por PCR-RT

### Hisopado Cervical

#### 1. Requisitos de preparación:

- Abstinencia sexual tres días previos al examen.
- No aplicar cremas vaginales, óvulos, espermicidas íntimos o talco.
- No estar menstruando ni haberse realizado eco transvaginal durante las 48 horas previas.
- Si es el caso, suspender tratamientos tópicos y antibióticos 7 días previos a la toma de la muestra (consultar con profesional tratante).
- Idealmente, vacíe su vejiga antes del examen.

**2. Recolección de la Muestra:** Será realizada en sala de procedimientos ginecológicos.

**3. Traslado de la Muestra:** No aplica.

**Nota:** Si usted está embarazada y presenta síntomas de parto prematuro (contracciones), la muestra debe ser tomada por su profesional tratante

### Hisopado Uretral

#### 1. Requisitos de preparación:

- Abstinencia sexual tres días previos al examen.
- La muestra debe ser tomada **antes de la primera orina de la mañana**. De no ser así, esperar de **2 a 4 horas desde la última micción**.
- Si es el caso, suspender tratamientos tópicos y antibióticos 7 días previos a la toma de la muestra (consultar con profesional tratante).
- No aplicarse cremas.
- Si existe exudado, limpiar cuidadosamente con algodón.

**2. Recolección de la Muestra:** Será realizada en la toma de muestra.

**3. Traslado de la Muestra:** No aplica.

## Orina primer chorro

### 1. Requisitos de preparación:

- Tome la muestra de preferencia al despertar (primera orina del día) o **de 3 a 4 horas después de haber orinado por última vez.**
- Previo a la recolección debe realizarse un aseo del área genital con agua y jabón; enjuague bien retirando exceso de jabón.
- En mujeres con secreción vaginal o menstruación es recomendable tomar la muestra en la toma de muestra del laboratorio.

### 2. Recolección de la Muestra:

- Luego del aseo, **emita el primer chorro de orina directamente en el frasco** hasta completar la mitad del frasco (25 ml aproximadamente).
- Cierre herméticamente el frasco, asegurándose de que la tapa está bien colocada para evitar derrames.
- Rotule el frasco con nombre del paciente, RUT o pasaporte y fecha de la toma de muestra.

### 3. Traslado de la Muestra: Mantener en refrigeración durante su recolección y traslado al laboratorio clínico. (antes de 2 horas).

## Líquido Seminal

### 1. Requisitos de preparación:

- Debe tener un periodo de abstinencia sexual de 3 a 4 días como mínimo o los días que le indique su médico.

### 2. Recolección de la Muestra:

- Realice aseo de la zona genital con agua.
- No tocar el interior del frasco estéril (para evitar contaminación)
- Obtener la muestra mediante masturbación y colocar la totalidad directamente en el frasco estéril.
- Registrar la fecha y hora en que fue tomada la muestras y los días de abstinencia.

### 3. Traslado de la Muestra:

- Una vez obtenida la muestra, lleve el frasco junto con la solicitud de examen a la unidad de toma de muestra central (Laboratorio Clínico Labdom - Almirante Simpson 1368) antes de 1 hora, dentro de una bolsa.
- Horario de recepción de muestras: Lunes a viernes de 8:00 – 12:30 horas y de 14:30 - 15:00 horas. - sábados de 8:00 – 11:00 Horas.
- Mantenga la muestra lo más protegida y cercana a la temperatura corporal que le

sea posible. Puede trasladarla en el bolsillo, de lo contrario, se recomienda utilizar un recipiente aislante (plumavit). **NO REFRIGERE**